

Contre-indication

En présence d'herpès ou de dermatite atopique, un peeling fait l'objet d'une contre-indication absolue.

En cas de traitement par Rétinoïdes (par exemple, le Roaccutane) ou de Vitamine A Acide, le traitement fait l'objet d'une contre-indication relative.

Les patients sous traitement antiplaquettaire (Warfarine, Héparine, Aspirine, AINS) peuvent présenter des saignements et un développement d'escarre.

Le traitement ne doit pas être utilisé chez les patients atteints d'une pathologie cutanée active.

Un peeling ne peut être réalisé sur les zones mateuses, sur une inflammation, une irritation ou une abrasion.

Le peeling ne doit pas être utilisé en association avec d'autres traitements esthétiques comme la microdermoabrasion, l'électrolyse, l'épilation, l'épilation au laser, les cires dépilatoires ou les agents décolorants.

Il est primordiale de respecter après l'intervention les exigences post-traitement, notamment les exigences de photo protection (utilisation de protection solaires haute protection).

La présence d'acné excoriée peut provoquer de graves infections, voir – plus tard – des cicatrices.

Docteur

Cédric Kron



Pour tout renseignement :

www.dr-kron-chirurgie-esthetique.com

82 Boulevard de Courcelles
75017 PARIS

Tel. : 01 45 62 85 00

Fax : 01 45 62 04 04

Portable : remis aux patientes opérées

Ancien Chef de Clinique à la Faculté de Paris
Ancien Assistant des Hôpitaux de Paris
Ancien Interne Médaille d'Or des Hôpitaux de Paris
Lauréat de la Faculté de Médecine
Ancien Praticien-Attaché à l'Hôpital Rothschild - Paris

Membre de la Société Française de Chirurgie Plastique,
Reconstructrice et Esthétique
Membre de la Société Française des Chirurgiens Esthétiques
Plasticiens

PEELING GEL THIXOTROPE



Le Peeling est une intervention de médecine esthétique qui consiste à traiter les différentes couches de la peau de façon à la renouveler et ainsi atténuer les imperfections cutanées pour faire « peau neuve ». Il permet ainsi de redonner à la peau son éclat naturel.

Le principe d'un peeling

Un peeling est indiqué pour **corriger les imperfections cutanées au niveau du visage, du cou, du décolleté et du dessus des mains**. Il permet en particulier de corriger le teint terne, les pores dilatés, les ridules et rides, les cicatrices d'acné, le regard froissé, les cernes, les taches pigmentaires et le relâchement cutané.

L'action du peeling permet de :

- Corriger les signes du vieillissement et le relâchement cutanés
- Stimuler le renouvellement cellulaire
- Favoriser la production d'acide hyaluronique, de fibres élastiques et de collagène dans le derme
- Maintenir l'hydratation cutanée.
- Atténuer les peaux grasses ou acnéiques
- Traiter les excès de sébum (peau séborrhéique)
- Réduire les pores dilatés
- Traiter les mélasma superficiels ou moyens
- Réduire les flétrissures, la peau atone
- Réduire les taches pigmentaires
- Réduire les pigmentations réactionnelles
- Redonner de l'éclat à la peau
- Atténuer les cicatrices superficielles (acné, varicelle...)

- Traiter les taches et lésions liés au vieillissement ou au soleil (kératose actinique, kératose solaire)

Le déroulement de la séance

Avant l'intervention, il faut veiller à stopper l'application éventuelle de crème exfoliante à base d'acide glycolique (au moins 48h avant la première séance). La prise d'aspirine doit également être proscrite dans les 5 jours précédant l'intervention.

L'intervention consiste à appliquer le produit sur la zone à traiter après un nettoyage de la peau. La pose du produit dure environ 20 à 30 minutes. On ressent alors une sensation de chaleur et des picotements et des rougeurs temporaires sont visibles.

Le traitement se déroule en trois phases : pré-peeling, peeling, post-peeling :

1. Pré-peeling :

La première phase du traitement consiste à **préparer la peau à recevoir le traitement de façon à obtenir un résultat le plus homogène possible**. Le peeling débute par l'application du gel thixotrope Aellas Ready-S contenant une formule de silice qui facilite l'application du peeling et en améliore l'absorption et l'efficacité. Ce gel contient de l'aloès et du bisabolol pour une action apaisante et élimine doucement les résidus de cellules et de graisses.

2. Peeling :

Il existe **plusieurs options possibles** en fonction du résultat souhaité, des zones traitées, des suites impliquées et des caractéristiques des tissus du patient. Le Docteur Kron utilise notamment les gels Aellas Glyco-Eye, Aellas Glyco-50, Aellas STR, Aellas Jessner, TCA-Jessner, Aellas Salic-25, Aellas TCA-15, Aellas TC-25

3. Post-peeling :

La dernière phase du traitement consiste à appliquer la crème réparatrice Aellas Nourish.

Il s'agit d'une crème humidifiante et apaisante qui permet de **réparer et hydrater la peau immédiatement après le traitement**. Pour un effet hydratant, elle contient du Sodium hyaluronate, de la tréhalose, du ginkgo biloba, et du sodium lactate. Elle contient également des vitamines anti-oxydantes (A et E) de l'olivine (un film de lipide hydrolique) qui facilite la réparation de la peau et du bisabolol pour un effet apaisant.

Suites de l'intervention

Pendant les 3 à 7 jours qui suivent l'intervention, il est nécessaire d'effectuer des soins post-peeling en appliquant un crème hydratante prescrite. Plus sensible que d'habitude, la peau peut en effet desquamer à la suite de l'intervention. Ces réactions s'atténuent en quelques jours pour laisser apparaître une peau renouvelée, plus belle.

Entre les séances et après récupération de la peau, le médecin pourra vous conseiller d'appliquer une crème hydratante en fonction de l'indication.

Pour obtenir un résultat optimal, **2 à 6 séances espacées de 2 à 4 semaines peuvent être nécessaires**. Pour conserver le bénéfice des résultats, le traitement peut être renouveler 1 à 2 fois par an. Il est également possible d'envisager un renouvellement du traitement sous la forme d'une séance tous les 2-3 mois.